

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O SEU MEDICAMENTO PARA ILTB

RIFAPENTINA + ISONIAZIDA

Você foi diagnosticado com **infecção latente da tuberculose (ILTB)**, isto é, você tem a bactéria da tuberculose (TB) em seu organismo, porém você **NÃO** desenvolveu a doença ativa e **NÃO** transmite a TB para outras pessoas. A rifapentina + isoniazida é uma associação medicamentosa para tratar a ILTB, que irá **prevenir** que você fique doente.

A EQUIPE DA UNIDADE
DE SAÚDE IRÁ AUXILIÁ-LO
SOBRE O SEU TRATAMENTO
SEMPRE QUE VOCÊ
PRECISAR, PORTANTO:



- Fale sobre suas dúvidas ou preocupações;
- Compareça em todas as consultas agendadas;
- Converse com a equipe de saúde sobre a ingestão de álcool. O álcool pode aumentar a chance de você ter inflamação no fígado (hepatite);
- Fale sobre TODOS os outros medicamentos que você está tomando, pois um medicamento pode ter efeito sobre o outro;
- Tome os medicamentos conforme as orientações da equipe da unidade de saúde;
- Caso se consulte em outras unidades de saúde, comunique que você está em tratamento para ILTB.

Dicas para ajudá-lo a tomar a rifapentina + isoniazida:

- Os medicamentos são tomados apenas 1x por semana. Defina o dia da semana de sua preferência para a tomada dos medicamentos (por exemplo, todas as quartas-feiras).
- Tome a rifapentina + isoniazida sempre no mesmo dia da semana e nos mesmos horários definidos, lembrando que a isoniazida deve ser tomada em jejum e a rifapentina junto com alimentos.
- Defina um lembrete de alarme para o horário em que você deve tomar a rifapentina + isoniazida.
- Peça a um membro da família ou amigo para lembrá-lo de tomar a rifapentina + isoniazida.
- Guarde o medicamento sempre no mesmo local (longe de calor e umidade).
- Coloque um lembrete no espelho ou na geladeira.
- Use um calendário para marcar o dia da semana em que você toma a rifapentina + isoniazida.
- Se for viajar, lembre-se de levar o medicamento com você.

Cronograma do tratamento

com rifapentina + isoniazida para ILTB

Medicamento	Quando tomar?	Qual dia da semana?	Quantos comprimidos por semana?	Qual o tempo total de tratamento?
Rifapentina + Isoniazida	1 vez por semana			3 meses (12 a 15 semanas)

Se você se esquecer de tomar a rifapentina + isoniazida:

- Se ainda for no mesmo dia, tome o comprimido assim que você se lembrar;
- Se não for no mesmo dia, tome o medicamento dentro dos 3 dias seguintes e volte à sua rotina normal de tomada de medicamentos no dia da semana definido no início do tratamento;
- Caso se esqueça de tomar a dose por mais de 3 dias, informe a equipe da unidade de saúde imediatamente para que o tempo de tratamento seja readequado.



O seu compromisso em tomar semanalmente os remédios e seguir as recomendações da equipe da unidade de saúde é muito importante para o sucesso do tratamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Nome do meu médico: _____

Nome da unidade de saúde: _____

Número de telefone da unidade de saúde: _____

Data da próxima consulta: _____

Data da próxima consulta: _____

Data da próxima consulta: _____

Data da próxima consulta: _____

Sintomas das reações mais comuns no tratamento com rifapentina + isoniazida



- Ao tomar a rifampicina, é normal perceber que urina, saliva, lágrimas ou suor fiquem com uma cor laranja-avermelhada. Se você usa lentes de contato, tome cuidado, pois elas também podem ficar dessa cor.
- Náusea, vômito, dor de estômago, pele ou olhos amarelados (icterícia), fraqueza, formigamento ou dormência nos pés ou nas mãos, manchas na pele e febre.

PROCURE IMEDIATAMENTE O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CASO VOCÊ APRESENTE OS SEGUINTES SINAIS OU SINTOMAS:

- Diminuição ou falta de apetite por comida
- Dor de estômago ou cólicas estomacais
- Febre
- Dores de cabeça ou corpo
- Náusea ou vômito
- Urina com cor escura ou fezes claras
- Coceira e vermelhidão na pele
- Pele ou olhos amarelados (icterícia)
- Formigamento ou dormência nas mãos ou nos pés
- Dor nas articulações
- Grave fraqueza ou cansaço
- Tontura



REGISTRO DO TRATAMENTO COM RIFAPENTINA + ISONIAZIDA

Registre seu tratamento na tabela, conforme o exemplo a seguir. Se você vai iniciar o tratamento com rifapentina + isoniazida na terça-feira (dia 10/05/2022), você vai escrever, na coluna “Semana”, o intervalo de dias daquela semana (09-15/05/2022); na coluna “Terça”, você vai escrever a data que tomou os medicamentos (10/05); e, nos outros dias, vai marcar um “x”. Faça o mesmo para as outras semanas para continuar o tratamento até finalizá-lo.

Lembrando sempre que os medicamentos devem ser tomados sempre no mesmo dia da semana.

Semana	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
09 a 15 maio/2022	x	10/05	x	x	x	x	x

Registro do tratamento com rifapentina + isoniazida

Semana	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
Semana 1							
Semana 2							
Semana 3							
Semana 4							
Semana 5							
Semana 6							
Semana 7							
Semana 8							
Semana 9							
Semana 10							
Semana 11							
Semana 12							
Semana 13							
Semana 14							
Semana 15							